

آمادگی برای فصل تولید مثل

سیستم پرزایی، توجه به دام در دوران بارداری و تعیین بهترین روش توسط دامدار نقش بسیار مهمی در پرورش گوسفند دارد. هر چه شاهد بارداری بیشتری در طول سال باشیم، گله با سرعت بیشتری رشد می‌کند و دامدار از سود بیشتری بهره‌مند خواهد شد.



به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ سیستم پرزایی، توجه به دام در دوران بارداری و تعیین بهترین روش توسط دامدار نقش بسیار مهمی در پرورش گوسفند دارد. هر چه شاهد بارداری بیشتری در طول سال باشیم، گله با سرعت بیشتری رشد می‌کند و دامدار از سود بیشتری بهره‌مند خواهد شد.

چه اتفاقاتی در اواخر آبستنی رخ می‌دهد؟

- ۷۰ درصد رشد جنین در این دوران رخ می‌دهد.

- رشد پستان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

- حجم شکمبه به دلیل رشد جنین کم می‌شود.

تغذیه دام در دوران آبستنی

- دام آبستن در این دوران باید میزان کافی از مواد مغذی را دریافت کند تا رشد جنین مناسب باشد، بعد از تولد وزن مناسبی داشته باشد و میش پس از زایمان دچار مسمومیت آبستنی نشود.

- اواخر آبستنی زمان مناسبی برای کاهش کیفیت خوراک نیست.

- در این دوران تغذیه دام‌ها باید پرانرژی باشد. بنابراین افزودن مواد دانه ای به جیره ضرورت دارد بخصوص برای دام‌های چند قل آبستن.

- البته تغذیه بستگی به سن، وزن، گونه دام و تعداد قل‌های دام آبستن دارد.

- خوراک دادن بیش از حد می‌تواند منجر به سخت زایی، پروالپس یا بیرون زدگی واژن، و بیرون زدگی رحم شود.

مدیریت تغذیه

- دام‌های جوان و مسن نباید باهم خوراک دریافت کنند.

- دام‌های ماده باید از دام‌های نر جدا تغذیه کنند.

- شیشک‌ها از دام‌های چند شکم زایش باید جداگانه خوراک دریافت کنند.

- پس از فصل جفتگیری، دام‌های نر از ماده‌ها جدا شوند.



توجه به میزان دریافت آب در اواخر آبستنی

- نیاز دام آبستن به آب در اواخر آبستنی تقریباً دو برابر می‌شود.

- آب مورد مصرف دام باید تمیز باشد.

- آب نباید دچار یخزدگی شده باشد.

ویتامین ای و سلنیم

- معمولاً دام‌ها از لحاظ این دو ماده دچار کمبود هستند.

- سلنیم به افزایش سیستم ایمنی کمک می‌کند.

- کمبود **سلنیم** و یا ویتامین ای می‌تواند باعث بیماری عضله سفید شود.

- مراقب باشید که تجویز سلنیم با مشورت دامپزشک باشد چرا که مقادیر بیش از حد آن منجر به مسمومیت می‌شود.

نیاز به کلسیم

- کلسیم جهت رشد جنین و افزایش شیر میش اهمیت دارد.

- نیاز به کلسیم در اواخر آبستنی تقریباً دو برابر می‌شود.

- بخصوص نیاز بزهای شیری به کلسیم بیشتر است.

- کمبود کلسیم در دوران آبستنی می‌تواند منجر به بیماری تب شیر در دام تازه زا شود.

- به نظر می‌رسد کمبود کلسیم با افزایش احتمال بیرون زدگی واژن ارتباط داشته باشد.

درمان ضد انگل

- اگر دام آبستنی علائم بیماری انگلی را نشان می‌دهد یا آزمایش تخم انگل آن حاکی از آلودگی است، درمان ضد انگل را انجام دهید.

- توجه کنید که برخی از داروهای ضد انگل در اواخر آبستنی نباید مصرف شوند.

واکسیناسیون در اواخر آبستنی

- دام‌ها باید در اواخر آبستنی علیه بیماری‌های کلستریدیایی واکسینه شوند.

- با این کار، بره‌ها و بزغاله‌های متولد شده تا زمان تجویز دز اول واکسن، ایمن خواهند بود.

سقط جنین

- در صورتی که دام‌های آبستن در یک سن آبستنی قرار ندارند، ممکن است مواردی از سقط جنین را در گله مشاهده کنید.

- در این زمان از دامپزشک خود کمک بگیرید تا از سایر دام‌ها در برابر سقط جنین محافظت کنید.

- دام سقط کرده را فوراً جدا کنید.

- جنین سقط شده، جفت و ترشحات را به خوبی امحاء کنید و از دادن آن‌ها به سگ خودداری نمایید.

- از دام سقط کرده، جفت و جنین جهت تشخیص علت سقط نمونه‌گیری کنید و به آزمایشگاه ارسال نمایید.

از اقدامات استرس‌زایی از جمله حمل و نقل و جابجایی دام آبستن، در معرض سرما و وزش باد قرار دادن دام‌ها، کاهش ناگهانی خوراک و مقید کردن نادرست دام‌ها پرهیز کنید.